

神経がたかぶって
不眠が続く方に

漢方 ナイトミン 抑肝散錠

効能・効果

体力中等度をめやすとして、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：神経症、不眠症、歯ぎしり、更年期障害、血の道症^注

注「血の道症」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである

用法・用量 次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

年 齢	1回量	服用回数
大人（15才以上）	4錠	1日2回
15才未満	×	服用しないこと

成分・分量 1日量（8錠）中
抑肝散エキス（3／5量）1.98g

トウキ・チョウトウコウ・センキウ 各1.8g、
ソウジュツ・ブクリョウ 各2.4g、サイコ1.2g、
カンゾウ 0.9g より抽出

添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、
CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖を含有する

●本剤は天然物（生薬）を用いているため、
錠剤の色が多少異なることがあります

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守すること
●食間とは「食事と食事の間」を意味し、
食後約2～3時間のことをいいます

40錠 5日分

第2類医薬品



小林製薬

漢方 ナイトミン 抑肝散錠

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりしめること

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください
使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

第2類医薬品

販売名：漢方ナイトミン 抑肝散錠

漢方製剤

△ 使用上の注意

相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 胃腸の弱い人 (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
心不全	動くと息が苦しい、疲れやすい、足がむくむ、急に体重が増えた
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん（皮ふや白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりして保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる） (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社 製造販売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10 〒562-0029 大阪府箕面市彩都葉生北44-66

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

MADE IN JAPAN